

## HPV疫苗保護力有多久

目前研究顯示，保得疫苗的保護力可維持至少9.4年，嘉喜疫苗至少有12年，「嘉喜9」疫苗(九價疫苗)保護力為至少6年，但是能否維持更久、未來是否需要再追加，都尚在觀察中。

## 誰需要打HPV疫苗

世界衛生組織(WHO)建議，HPV疫苗應納入國家疫苗接種計畫，且對9-14歲沒有性經驗且未曾感染人類乳突病毒的女生接種較有效益，這也是政府提供國一女生疫苗接種之原因。



## 接種疫苗注意事項跟副作用

- 懷孕或準備懷孕者不宜接種。接種前如有以下情形者，應告知醫師並請醫師評估：本身有特殊疾病者、藥物和食物過敏史、免疫功能異常、出血性問題、任何身體不適如發燒、感染。如果接種後發現已懷孕，無須驚慌，只要停止後續尚未接種的劑數即可。
- 接種HPV疫苗可能發生的常見不良反應為注射部位疼痛、局部腫脹、發癢、輕微發燒、頭痛、頭暈等，大多屬輕微至中等程度且為時甚短。
- 接種後應原地休息30分鐘，沒有任何不良反應再離開，如果之後有任何不舒服的情形都請通知學校校護、醫療院所或衛生所等原接種單位，亦可撥打HPV疫苗24小時服務專線0800-88-3513(寶貝，守護一生)。



# 施打HPV疫苗 守護健康 保護自己



守護健康  
衛生福利部 國民健康署

廣告

國民健康署運用菸品健康福利捐支應

## 什麼是HPV

人類乳突病毒(Human Papillomavirus,簡稱HPV)是一種病毒，會感染人體的表皮與黏膜組織。它有一百多型，分為低危險型與高危險型，是重要的性接觸傳染病源。

## 什麼是HPV疫苗

持續感染高危險型人類乳突病毒(HPV)是子宮頸癌發生的主因，目前已研發出可預防人類乳突病毒感染的疫苗，因疫苗的涵蓋價數不同，理論上可以預防60-90%的HPV感染。目前我國核准之疫苗，分為二價、四價、九價三種。疫苗上市前經過嚴謹的安全性試驗評估，顯示HPV疫苗是安全且有效的。

\*疫苗價數表示可預防之HPV型別數量



## HPV疫苗介紹

疫苗名稱	保倍(二價) Cervarix		嘉喜(四價) Gardasil		嘉喜(九價) Gardasil 9	
適用對象	9-14歲；女性	15歲以上；女性	9-13歲；女性	14-45歲女性 9-26歲男性	9-14歲 女性及男性	15-26歲 女性及男性
施打劑數	2劑	3劑	2劑	3劑	2劑	3劑
第1劑	第0個月		第0個月		第0個月	
第2劑	隔6個月	隔1個月	隔6個月	隔2個月	隔6個月	隔2個月
第3劑	X	第1劑後6個月	X	第2劑後4個月	X	第2劑後4個月
預防型別	HPV第16、18型		HPV第6、11、16、18型		HPV第6、11、16、18、31 33、45、52和58型	

疫苗資訊均記載於仿單中，最新仿單資訊請查詢食品藥物管理署網站  
<http://www.fda.gov.tw/TC/index.aspx>

相關資訊請上國民健康署官網  
<http://www.hpa.gov.tw>

如有發生不良反應，請至  
食品藥物管理署不良反應通報系統  
(<http://adr.fda.gov.tw>)  
通報或撥打02-23960100  
進行通報